

QuickBayt® Spray

Insekticidní nástraha pro profesionální použití ve formě granulí určená k hubení mouchy domácí.

Účinná látka: **imidakloprid (ISO) 100 g/kg**
cis-trikos-9-en 1 g/kg



VAROVÁNÍ

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.

Výrobce: Bayer S.A.S., 16 Rue Jean-Marie Leclair, F-69009 LYON, Francie

V ČR registruje/dodavatel: Bayer s.r.o., Siemensova 4, 155 00 Praha 5, tel: 266 101 111

Číslo oznámení: : REG-3371-06.01.05/432

Působení

Přípravek působí na mouchy jako požerový jed, ale má i částečný kontaktní účinek. Mouchy přijímají aplikovaný přípravek jako potravu, protože obsahuje cukr. Jsou rovněž lákány atraktantem cis-trikos-9-en. Používá se ve všech objektech živočišné výroby (vepřiny, kravíny, chovy drůbeže) a dalších objektech kde se moucha vyskytuje (zpracovatelský průmysl, objekty komunální hygieny apod.). Přípravek je bílé barvy a nezanechává barevné skvrny, je však třeba vzít do úvahy, že podstatnou složku tvoří cukr a postřik je prováděn jeho roztokem. Přípravek lze odstranit z ošetřených povrchů omytím vodou. Obsahuje silně hořkou látku (Bitrex), která chrání před náhodným požitím člověkem.

Návod k použití

Postřikem: Rozmíchejte odměřené množství přípravku ve vodě a vlijte jej do nádrže postřikovače, který pracuje s nízkým tlakem (cca 1 bar) a proveďte postřik míst, kde se mouchy shromažďují (stěny, rámy oken, přepážky, konstrukce apod.). Po skončení práce vypláchněte postřikovač teplou vodou.

Nátěrem: Přípravek důkladně rozmíchejte ve vodě na řídkou pastu a proveďte nátěr míst, kde se mouchy nejvíce vyskytují.

Dávkování:

Postřikem:

250 g přípravku rozmíchejte ve 2 l vody.

Toto množství je určeno k ošetření objektu, který má 100 m² podlahové plochy, přičemž se postřik aplikuje na cca 40 m² stěn, případně jiných ploch, kde se mouchy shromažďují.

Nátěrem:

250 g přípravku rozmíchejte v 200 ml (vlažné) vody. Toto množství je určeno k ošetření objektu, který má 100 m² podlahové plochy. Nátěr aplikujte na malé plochy (cca 10 x 30 cm). Minimálně je třeba ošetřit 30 míst na každých 100 m² podlahové plochy objektu. Je možno rovněž natřít kartónové desky a zavěsit je v prostoru.

Mouchy uhynou do několika minut po příjmu nástrahy. Insekticidní účinek přetrvává dle podmínek 4 – 6 týdnů. Po této době se v případě potřeby provede opakování zásahu.

Bezpečnostní opatření

Při práci s přípravkem používejte ochranný pracovní oděv dle ČSN EN 13034-A1 (typ 6), gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem proti chemickému nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1, gumovou obuv a ochranné brýle (ČSN EN 166 - oblast použití 5).

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je nutno umýt obličej a ruce teplou vodou a mýdlem. Zabraňte styku přípravku se zvířaty, vodou, krmivem a prostory, kde se s nimi manipuluje. Neošetřujte plochy, s kterými přichází obsluha při běžné práci do styku.

První pomoc

Všeobecné pokyny: postiženého vynesete z nebezpečného prostoru. Odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv.

Při potřísnění pokožky: odstraňte potřísněný oděv a před dalším použitím jej vyperte nebo nechejte vyčistit.

Zasaženou pokožku omyjte vodou a mýdlem. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledejte lékařské ošetření.

Při vniknutí do očí: ihned vymývejte proudem vody po dobu minimálně 15 minut. Po prvních 5 min. vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou používány. Vyhledejte lékařské ošetření, pokud dráždění přetrvává. Kontaktní čočky nesmí být opětovně používány.

Při požití: vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Léčbu postiženého může lékař konzultovat s toxikologickým střediskem v Praze: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel: 22491 9293.

Skladování

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v suchých, chladných a dobře odvětraných skladech.

Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů.

Doba použitelnosti 3 roky od data výroby.

Odstranění obalů, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod

Případné zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se použijí k ošetření. Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jinému účelu! Případné nepoužité zbytky přípravku a prázdné obaly (3x vypláchnuté vodou a znehodnocené) se předají oprávněné osobě k odstranění.

Hmotnost: 1 kg

Číslo šarže a datum výroby: uvedeno na obalu