

DERALAN G

Rodenticid ve formě granulí

Nástraha na ničení škodlivých hlodavců (potkan, krysa, myš domácí) v uzavřených prostorách.

Složení: 100g přípravku obsahuje :

Bromadiolon 50 mg.l¹, tj. 0,005 % (EC 249-205-9)

Kukuřičný a pšeničný šrot, rybí moučka, aromatické látky 99,995 %

Upozornění

JED NA HLODAVCE!

CHRAŇTĚ PŘED DĚTMI, NEPOUČENÝMI OSOBAMI A ZVÍŘATY!

Pro hospodářské, domácí a volně žijící zvířata nebezpečný!

Pro ryby a ostatní vodní živočichy mimořádně jedovatý!

Uložte mimo dosah zvířat!

POUŽÍVAT PODLE NÁVODU!

Mechanismus účinku

Snížení srážlivosti krve zamezením tvorby protrombínu.

Vlastnosti

Bromadiolon je hydroxykumarínový derivát druhé generace s antikoagulačním účinkem proti všem druhům hlodavců, včetně těch, které jsou rezistentní proti jiným rodenticidům. Působí na hlodavce smrtelně už po jednorázovém požití nástrahy. Deralan je hlodavci velmi dobře přijímaný.

Návod na použití

- **potkan a krysa:** Důležité je umístění nástrah na místa trvale navštěvované hlodavci. Nástrahy klad'te v množství cca 100 g na jednu hromádku. Položené množství nástrah a hustota rozmístění těchto hromádek záleží na velikosti populace v daném objektu.

- **myš domácí:** nástrahy klad'te do míst výskytu hlodavců. Vzhledem k tomu, že myši mají poměrně malý akční rádius je potřebné zvýšit hustotu rozložení nástrah a to na jednu hromádku asi 25 g. Otrávení hlodavci hynou za 3 až 10 dní podle množství požitých latentní dávky.

Bezpečnostní opatření

Při kladení nástrah nejezte, nepijte, nekuřte! Používejte pracovní rukavice. Nástrahy klad'te na místa tak, aby byly nedosažitelné pro domácí a hospodářské zvířata. Chraňte před dětmi.

S věty:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S20/21 nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem

S36/37/39 Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít

S45 V případě nehody, nebo jestli se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jestli je to možné, ukažte toto označení)

První pomoc

Po požití přípravku vypláchněte důkladně ústa vodou, vypijte 0,3 litru vlažné vody nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc! po kontaminaci očí - tyto vyplachovat proudem čisté vody po dobu aspoň 10 minut. Přivolat lékaře!

Po kontaminaci pokožky - tuto umýt teplou vodou a mýdlem.

Při podezření na otravu přivolat lékaře, kterého informujte o přípravku (brodifacoum - způsobuje krvácení) a poskytnuté první pomoci. Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, telefon 224 91 92 93**

Informace pro lékaře: **Antidotum vitamín K**

Skladování

Skladovat na suchém místě mimo dosah dětí a zvířat, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, dezinfekčních prostředků, jiných chemických látek a obalů od těchto látek.

Likvidace obalů

Obaly po důkladném vyprázdnění spalte v schválené spalovně.

Výrobce : DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice

Distributor : SLOM s.r.o. Zálešná IV/ 1177 Zlín 760 01

Telefon : +420577431128 , **Fax** : +420577218701 , **E-mail** : slom@slom.cz

Balení a obsah

Kategorie použití: PE pytle 25 kg

Datum výroby : uvedený na obale

Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., Č.J. REG - 33. 7. 1. – 18. 1. 07 /2336

Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 39/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.