

## **DERALAN Z**

### **Rodenticid ve formě mořeného zrna**

Nástraha na ničení škodlivých hlodavců (potkan, krysa, myš domácí) v uzavřených prostorách.

**Složení:** 100g přípravku obsahuje :

Bromadiolon 50 mg.l<sup>1</sup>, tj. 0,005 % ( EC 249-205-9 )

Pšeničné zrno

#### **Upozornění**

**JED NA HLODAVCE!**

**CHRAŇTĚ PŘED DĚTMI, NEPOUČENÝMI OSOBAMI A ZVÍŘATY!**

Pro hospodářské, domácí a volně žijící zvířata nebezpečný!

Pro ryby a ostatní vodní živočichy mimořádně jedovatý!

Uložte mimo dosah zvířat!

**POUŽÍVAT PODLE NÁVODU!**

#### **Mechanismus účinku**

Snížení srážlivosti krve zamezením tvorby protrombínu.

#### **Vlastnosti**

Bromadiolon je hydroxykumarínový derivát druhé generace s antikoagulačním účinkem proti všem druhům hlodavců, včetně těch, které jsou rezistentní proti jiným rodenticidům. Působí na hlodavce smrtelně už po jednorázovém požití nástrahy. Deralan je hlodavci velmi dobře přijímaný.

#### **Návod na použití**

- **potkan a krysa:** Důležité je umístění nástrah na místa trvale navštěvované hlodavci. Nástrahy kladte v množství cca 100 g na jednu hromádku. Položené množství nástrah a hustota rozmístění těchto hromádek záleží na velikosti populace v daném objektu.

- **myš domácí:** nástrahy kladte do míst výskytu hlodavců. Vzhledem k tomu, že myši mají poměrně malý akční rádius je potřebné zvýšit hustotu rozložení nástrah a to na jednu hromádku asi 25 g. Otrávení hlodavci hynou za 3 až 10 dní podle množství požitých latentních dávek.

#### **Bezpečnostní opatření**

Při kladení nástrah nejezte, nepijte, nekuřte! Používejte pracovní rukavice. Nástrahy kladte na místa tak, aby byly nedosažitelné pro domácí a hospodářské zvířata. Chraňte před dětmi.

#### **S věty:**

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

S20/21 nejezte, nepijte a nekuřte při používání

S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem

S36/37/39 Používejte vhodný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle, nebo obličejový štít

S45 V případě nehody, nebo jestli se necítíte dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (jestli je to možné, ukažte toto označení)

### **První pomoc**

Po požití přípravku vypláchněte důkladně ústa vodou, vypijte 0,3 litru vlažné vody nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc! po kontaminaci očí - tyto vyplachovat proudem čisté vody po dobu aspoň 10 minut. Přivolat lékaře!

Po kontaminaci pokožky - tuto umýt teplou vodou a mýdlem.

Při podezření na otravu přivolat lékaře, kterého informujte o přípravku (brodifacoum - způsobuje krvácení) a poskytnuté první pomoci. Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, telefon 224 91 92 93**

Informace pro lékaře: **Antidotum vitamín K**

### **Skladování**

Skladovat na suchém místě mimo dosah dětí a zvířat, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků, dezinfekčních prostředků, jiných chemických látek a obalů od těchto látek.

### **Likvidace obalů**

Obaly po důkladném vyprázdnění spalte v schválené spalovně.

**Výrobce** : DeArt s.r.o., Tekovská 16, 934 01 Levice

**Distributor** : SLOM s.r.o. Zálešná IV/ 1177 Zlín 760 01

**Telefon** : +420577431128 , **Fax** : +420577218701 , **E-mail** : slom@slom.cz

### **Balení a obsah**

**Kategorie použití**: 300 g, 25 kg

**Datum výroby** : uvedený na obale

**Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., Č.J. REG - 33. 7. 1. – 18. 1. 07 /2336**

**Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 41/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.**