

## **DERATION**

### **Parafinát**

**Rodenticid – parafínové bloky. Nástraha proti myším, potkanům, hrabošům a hryzcům v domácnostech a ve sféře komunálních služeb. Nástraha je formována do bloků různých tvarů a velikostí.**

Přípravek ničí všechny druhy škodlivých hlodavců. Vysokou účinnost vykazuje hlavně vůči potkanům, kterou zvyšují obsažené pojiva, čím se zvyšuje efektivnost účinné látky. Působení přípravku se začne projevovat až po několika dnech po pozření. Zasažený jedinec hyne na následky bezbolestného vnitřního krvácení. Jedinci, kteří přípravek zkonzumovali, už po prvním požití mají pocit nedostatku vzduchu a proto odcházejí uhynout na otevřená místa. Tím nevzniká u ostatních jedinců nedůvěra k nástraze. Takto se zabezpečí kompletní deratizace při úplném vyhubení škodlivých hlodavců.

**Složení:** 100 g přípravku obsahuje:

Bromadiolon ..... 0,005 g ( EC 249-205-9 )

Obilniny, pojiva, chuťové a atraktivní látky ..... doplněné do 100 g. ( 99,995 )

**Zabraňte ohrožení člověka a životního prostředí, postupujte podle návodu na použití.**

**Návod na použití:** nástrahu pokládejte na hromádky 25 – 50 g na vzdálenost 2 – 10 m (u myší do 3 m, pro potkany nad 5 m) na místa nejčastěji navštěvovaná hlodavci (obydlí, kanalizace a kanály, zahrady, sklady, smetiště a pod.). Odběr nástrahy sledujte a doplňujte ji až do úplného vyhubení nežádoucích hlodavců. Při pokládání nástrahy vždy používejte gumové rukavice. Přípravek pokládejte na deratizační misky a případně i vhodně ho upevněte a nebo maskujte. Nejhodnější a nejbezpečnější způsob je umísťování do monitorovacích jedových staniček.

**Upozornění:** S2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmení. S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

S24 Zamezte styku s kůží. S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. S37 Používejte vhodné ochranné rukavice. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Seznamte se, se speciálními instrukcemi v bezpečnostním listě.

#### **První pomoc:**

**při nadýchání:** vyvést postiženého na čerstvý vzduch a konzultovat s lékařem;

**při kontaktu s pokožkou:** odstranit znečištěný oděv a pokožku umyjte větším množstvím vody a mýdla. Zasažené místo pozorovat po dobu 24 hodin. V případě příznaků konzultovat s kožním lékařem;

**při kontaktu s očima:** oči vyplachujte při otevřených víckách minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody. Konzultujte s lékařem;

**při požití:** ihned po požití vyvolat zvracení. Později nevyvolávat zvracení, aby se nezvýšilo riziko vnitřního krvácení. Podat absorpční uhlí v dávce 25 – 100 mg a konzultovat s lékařem.

**Informace pro lékaře:** bromadiolon je antikoagulant, který blokuje činnost protrombínu a je inhibitorem vitamínu K. specifické antidotum – vitamín K.

Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, telefon 224 91 92 93**

**Skladování:** Skladujte v neporušených původních obalech, na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, krmiv, nápojů, léků a obalů pro jejich pach a stala se nedůvěryhodnou pro hladavci.

**Likvidace obalů:** Obal zneškodněte spálením ve schválené spalovně.

**Výrobce:** Colkim s.r.l., Ozzano Emilia (nebot), Italy

**Distributor:** SLOM s.r.o. Zálešná IV/1177 Zlín 760 01

**Telefon :** +420577431128 , **Fax :** +420577218701 , **E-mail :** slom@slom.cz

**Hmotnost:** 20 kg

**Doba použitelnosti:** do 18 měsíců od data výroby

**Datum výroby:** uvedený na obale

**Číslo šarže:** uvedené na obale

**Oznámeno dle §35 Zákona č. 120/2002 Sb., Č.j. REG – 33. 7. 1 – 18. 1. 07 /2337**

**Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 53/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.**