

## **DERATION** sáčky

**Rodenticid – těstovinové sáčky. Nástraha na hubení myši, potkanů, hrabošů a hryzců v domácnostech a v oblasti komunálních služeb.**

Přípravek ničí všechny druhy škodlivých hlodavců. Vysokou účinnost vykazuje hlavně vůči potkanům. Tato se začne projevovat až po několika dnech po pozření. Zasažený jedinec hyne na následky bezbolestného vnitřního krvácení. Jedinci, kteří přípravek zkonzumovali, už po prvním požití mají pocit nedostatku vzduchu a proto odcházejí uhynout na otevřená místa. Tím nevzniká u ostatních jedinců nedůvěra k nástraze. Takto se zabezpečí kompletní deratizace při úplném vyhubení škodlivých hlodavců. S těstovinovými 10 g sáčky je velmi lehká manipulace.

**Složení:** 100 g přípravku obsahuje:

Bromadiolon ..... 0,005 g ( EC 249-205-9 )  
Obilniny, rostlinný olej, chuťové a atraktivní látky doplněné do 100 g. ( 99,995 )

**Zabraňte ohrožení člověka a životního prostředí, postupujte podle návodu na použití.**

**Návod na použití:** nástrahu pokládejte na hromádky 30 – 50 g na vzdálenost 2 – 10 m (u myši do 3 m, pro potkany nad 5 m) na místa nejčastěji navštěvovaná hlodavci (obydlí, kanalizace a kanály bez vody, sklady, smetiště a pod.). Odběr nástrahy sledujte a doplňujte ji až do úplného vyhubení nežádoucích hlodavců. Při pokládání nástrahy vždy používejte gumové rukavice. Přípravek pokládejte na nepropustné deratizační misky a případně jej i vhodně upevněte anebo maskujte. Nejvhodnější a nejbezpečnější způsob je umístění do monitorovacích jedových staniček.

**Upozornění: S2** Uchovávejte mimo dosah dětí. **S13** Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv . **S20/21** Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

**S24** Zamezte styku s kůží. **S28** Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdla. **S37** Používejte vhodné ochranné rukavice. **S46** Při požití, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. **S 61** Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Seznamte se, se speciálními instrukcemi v bezpečnostním listě.

### **První pomoc:**

**při kontaktu s pokožkou:** odstranit znečištěný oděv a pokožku umyjte větším množstvím vody a mýdla. Zasažené místo pozorovat po dobu 24 hodin. V případě příznaků konzultovat s kožním lékařem;

**při kontaktu s očima:** oči vyplachujte při otevřených víčkách minimálně 15 minut velkým množstvím čisté tekoucí vody. Konzultujte s lékařem;

**při požití:** ihned po požití vyvolat zvracení. Později nevyvolávat zvracení, aby se nezvýšilo riziko vnitřního krvácení. Podat absorpční uhlí v dávce 25 – 100 mg a konzultovat s lékařem.

**Informace pro lékaře:** bromadiolon je antikoagulant, který blokuje činnost protrombínu a je inhibitorem vitamínu K. Specifické antidotum – vitamín K.

Léčení postiženého je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem v Praze, telefon 224 91 92 93**

**Skladování:** Skladujte v neporušených původních obalech, na suchém, tmavém a chladném místě, mimo dosah dětí, odděleně od potravin, krmiv, nápojů, léků a obalů pro ně určených. Taktéž skladovat odděleně od desinfekčních prostředků, hnojiv a chemikálií, aby nástraha nepohltila jejich pach a stala se nedůvěryhodnou pro hlodavci.

**Likvidace obalů:** Obal zneškodněte spálením ve schválené spalovně

**Výrobce:** Colkim s.r.l . Ozzano Emilia (neboť), Italy

**Distributor:** SLOM s.r.o. , Zálešná IV/1177 Zlín 760 01

**Telefon :** +420577431128 , **Fax :** +420577218701 , **E-mail :** slom@slom.cz

**Hmotnost:** 100g, 5kg , 20 kg

**Doba použitelnosti:** do 18 měsíců od data výroby

**Datum výroby:** uvedený na obale

**Číslo šarže:** uvedené na obale

**Oznámeno dle § 35 Zákona č. 120/2002 Sb., Č.j. REG – 33. 7. 1. – 18. 1. 07 / 2337**

**Povoleno pro používání v potravinářských provozech pod č. 54/2007 Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno.**