

## RaTaTa® požerová nástraha

požerová nástraha na hubení hlodavců ve formě speciální drcené směsi a granulátu, s ochrannou látkou Bitrex proti náhodnému požití.

Číslo povolení: Oznámeno dle § 35 Zákona č.120/2002 Sb., č.j. MZDR 70692/2010-SOZ, ze dne 07.12. 2010

Složení: 0,005g/kg bromadiolon; Bitrex 0,002g/kg; reg.č.CCHLP: bio/2259/D10/CCHLP

### **JED NA POTKANY A MYŠI!**

**Biocidní výrobek používejte bezpečně!**

**Použití: Na hubení hlodavců, potkanů a myší.**

RaTaTa nabízí současně dvě formulace, vynikající atraktivitu formou speciální směsi a zároveň podporu k hledání – granule. Proti jiným nástrahám vyniká vysokou atraktivitou /aroma/ následně se stává neodolatelným pro hlodavce. Velmi vhodné k umístění do míst, kde mají hlodavci možnost alternativního výběru potravy. Nástraha je balená v táčcích a uzavřená propustnou speciální fólií. Táčky je možné rozmísťovat bez uvolnění fólie, čímž můžeme preventivně chránit prostor před hlodavci. V případě zamoření prostoru si hlodavci sami otevřou fólii a dostanou se k nástraze. V nástraze je použita účinná látka bromadiolon, která působí opožděně a hlodavci ji velmi dobře odebírají, čímž se dosahuje maximální účinnosti.

Po otevření 2x200g balení, nástrahu v táčcích rozložte na místa výskytu hlodavců. Při výskytu potkanů každých 20 m. Při výskytu myší každých 5 m.

Nástrahy pravidelně po 3-4 dnech kontrolujte a jestliže je pozorovaný odběr pravidelný, doplňujte ji. Úhyn nastává po 5-10 dnech. Celkové vyhubení hlodavců od velikosti prostoru a stupně zamoření můžete dosáhnout po dostatečném rozmístění a doplňování nástrahy po 2-3 týdnech.

**Bezpečnostní opatření:** Při práci nejezte, nepijte a nekuřte!

**První pomoc:**

**Při náhodném požití** – Po požití přípravku vypláchněte ústa důkladně vodou, vypijte 0,3 l vlažné vody a nevyvolávejte zvracení. Urychleně vyhledejte lékařskou pomoc!

**Při kontaminaci očí** – tyto vyplachovat proudem pitné vody po dobu 10 – 15 minut, jestliže zarudnutí přetrvává zabezpečit vyšetření u očního lékaře.

**Při zasažení obleku a kontaminaci pokožky** – oblek vysvléci a postižené místo umýt teplou vodou a mýdlem. Při otravě nebo podezření na otravu přivolejte lékaře a informujte ho o složení přípravku a poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lékař léčbu může konzultovat s Toxikologickým informačním Praha, Telefon: 2 2491 9293, 2 2491 5402, 2 2491 4575, e-mail: [tis@cesnet.cz](mailto:tis@cesnet.cz).

**Informace pro lékaře:** protilátka K1 – vitamin /Konakion inj/

**Skladujte** v originálních neporušených obalech, v suchých, čistých, uzamčených a dobře větratelných skladech odděleně od potravin, nápojů, krmiv a hnojiv, léků, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek.

**Spotřebujte:** do dvou roků od data výroby, uvedeném na etiketě.

**Likvidace:** Prázdné obaly, kart. krabice spalte v příslušné spalovně. Uhynulé hlodavce posbírejte při použití ochranných rukavic do igelitového sáčku, spalte, zakopte hluboko do země na odlehleém místě, dostatečně vzdáleném od bydliště a mimo dosah dětí.

**Výrobce:** Bábolna Bio kft. Budapest Szállás u 6. [www.babolna-bio.com](http://www.babolna-bio.com)

**Distribuce pro CZ:** SLOM s.r.o., Zálešná IV/1177 PSČ 760 01

Tel. +420 577431128, Fax: +420 577218701, e-mail [slom@slom.cz](mailto:slom@slom.cz), [www.slom.cz](http://www.slom.cz)

### **Seznam označení na bezpečné používání (S-věty)**

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí. S24: Zamezte styku s kůží. S37: Používejte vhodné ochranné rukavice. S46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

**Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný domácími, hospodářskými, anebo volně žijícími zvířaty!**

**Balení a obsah:** 2x200g táčky v kart.; 4/12 kg plast. vědro; 25kg papírové pytle.